Study or Subgroup	AOX Events	AOX Total	Control Events	Control Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
10.1.5 PN						
Andrews	84	251	84	251	35.7%	1.00 [0.78, 1.28]
Angstwurm	7	21	11	21	4.1%	0.64 [0.31, 1.32]
Angstwurm 2007	46	116	61	122	26.5%	0.79 [0.60, 1.06]
Berger '98	1	10	0	10	0.2%	3.00 [0.14, 65.90]
Berger 2001a	2	9	1	12	0.4%	2.67 [0.28, 25.04]
Berger 2001b	0	11	1	12	0.2%	0.36 [0.02, 8.04]
Berger 2007	1	11	1	10	0.3%	0.91 [0.07, 12.69]
Berger 2008	14	102	9	98	3.5%	1.49 [0.68, 3.29]
El-Attar 2009	2	40	1	40	0.4%	2.00 [0.19, 21.18]
Forceville	14	31	13	29	6.9%	1.01 [0.58, 1.76]
Kuklinski	0	8	8	9	0.3%	0.07 [0.00, 0.98]
Manzanares 2011	3	15	5	16	1.4%	0.64 [0.18, 2.22]
Mishra	11	18	15	22	10.0%	0.90 [0.56, 1.43]
Porter	0	9	0	9		Not estimable
Valenta	19	75	24	75	8.4%	0.79 [0.48, 1.32]
Zimmerman	3	20	8	20	1.6%	0.38 [0.12, 1.21]
Subtotal (95% CI)		**747**		**756**	**100.0%**	**0.89 [0.77, 1.03]**
Total events	207		242			
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.00$; $Chi^2 = 12.60$, df = 14 (P = 0.56); $I^2 = 0\%$						
Test for overall effect: Z = 1.58 (P = 0.11)						
10.1.7 EN						
Crimi	49	112	76	112	83.5%	0.64 [0.50, 0.82]
Nathens	5	301	9	294	4.3%	0.54 [0.18, 1.60]
Preiser	8	20	6	17	7.2%	1.13 [0.49, 2.62]
Schneider	6	29	6	29	5.0%	1.00 [0.37, 2.74]
Subtotal (95% CI)		**462**		**452**	**100.0%**	**0.68 [0.54, 0.85]**
Total events	68		97			
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.00$; $Chi^2 = 2.35$, df = 3 (P = 0.50); $I^2 = 0\%$						
Test for overall effect: Z = 3.35 (P = 0.0008)						



Test for subgroup differences: $Chi^2 = 3.74$, df = 1 (P = 0.05), $I^2 = 73.3\%$