

Indikationsimpfungen bei Asplenie

Datum	Pneumokokken		Meningokokken			Haemophilus	Grippe	Unterschrift und Stempel
	PCV-13	PPV-23	MCV-C	MCV-ACWY	Men-B			

Antibiotikaprophylaxe

Präparat	von	bis	Präparat	von	bis

Für Abkürzungen siehe Impfplan auf der Rückseite

Im Auftrag und mit Unterstützung von:



Deutsche Gesellschaft für Infektiologie



Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie



Deutsche Sepsisgesellschaft



Deutsche Gesellschaft für Chirurgie



Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie



Deutsche Sepsis-Hilfe



Impressum

Abteilung Infektiologie, Klinik für Innere Medizin II
und IFB-Zentrum Chronische Immundefizienz (CCI)
Universitätsklinikum Freiburg



Hugstetter Straße 55
D-79106 Freiburg im Breisgau
aspleniepass@asplenie-net.org
www.asplenie-net.org



4/2018

Bestellformulare: www.asplenie-net.org

NOTFALLAUSWEIS

Medical Emergency Card Asplenia

Asplenie

(Fehlende Milz / Milzfunktion)

Es besteht ein erhöhtes Risiko für lebensbedrohliche Infektionen !

Inhaber

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Adresse	

Asplenie / Splenektomie

seit / am	
-----------	--

Im Notfall zu benachrichtigen

Name	
Telefon	

Schwere Antibiotikaallergie nein ja

gegen	
-------	--

Stempel des
Hausarztes
oder
Kinderarztes:

Impfplan bei Asplenie

Bitte Aktualisierungen unter www.asplenie-net.org beachten!

(Stand: 4 / 2018)

Alter	Grundimmunisierung	1. Auffrischimpfung	Weitere Auffrischimpfung
Pneumokokken			
2 Mo - 24 Mo.	gemäß Impfkalender STIKO	PSV-23 (nach 6-12 Mo.)	PSV-23 (nach 5-6. J.) **
3-5 J.	PCV-13 *	PSV-23 (im Alter von 6 J.)	PSV-23 (nach 5-6. J.) **
≥6 J. u. Erwachsene	1 x PCV-13	PSV-23 (nach 2-6 Mo.)	PSV-23 (nach 5-6. J.) **
* falls noch keine komplette Grundimmunisierung ** Notwendigkeit von PCV-13 Wiederauffrischung derzeit noch unklar			
Meningokokken			
2-11 Mo.	2 x Men-C (Abstand 2 Mo.)	Men-ACWY ⁺ (nach 12 Mo.)	Men-ACWY (nach 6-12 Mo.) ⁺⁺
≥ 1 J. u. Erwachsene	1 x Men-ACWY ⁺	Men-ACWY (nach 2 Mo.)	Men-ACWY (alle 5 J.)
⁺ Zulassung beachten: Nimenrix® ab 2. Lebensjahr; Menveo® ab 3. Lebensjahr; ⁺⁺ spätere Auffrischungen mit MCV-ACWY alle 5 J.			
2-5 Mo.	3 x Men-B † (Abstand 1 Mo.)	Men-B † (nach 12 Mo.)	Notwendigkeit derzeit unklar
6-23 Mo.	2 x Men-B † (Abstand 2 Mo.)	Men-B † (Abstand s. u.) ††	
2-10 J.	2 x Men-B † (Abstand 2 Mo.)		
≥ 10 J. u. Erwachsene	2 x Men-B † (Abstand 2 Mo.)	Men-B (Abstand 4 Mo.) †††	
† Zulassung beachten: Trumenba® erst ab 10 J. einsetzbar. †† Alter 6-11 Mo.: Auffrischung im 2. LJ (Abstand 2 Mo.), Alter 12-23 Mo.: Abstand 12 Mo. ††† erforderlich nur für Trumenba®			
Haemophilus influenzae Typ B			
2 Mo.-5 J.	Grundimmunisierung gemäß Impfkalender STIKO		
> 5 Jahre	Einmalige Impfung mit HiB-Konjugatimpfstoff		
Influenza (Grippe)			
≥ 2 Jahre	Jährliche Gripeschutzimpfung (aktuelle von der WHO empfohlene Antigenkombination)		
PCV-13	13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff	Prevenar-13®	
PSV-23	23-valenter Pneumokokken-Polysaccharidimpfstoff	Pneumovax®	
Men-C	Meningokokken-Konjugatimpfstoff Serogruppe C	Meningitec®, NeisVac-C®, Menjugate®	
Men-ACWY	Meningokokken-Konjugatimpfstoff Serogruppe A, C, W, Y	Menveo®, Nimenrix®	
Men-B	Meningokokken-Konjugatimpfstoff Serogruppe B	Bexsero®, Trumenba®	
HiB	Haemophilus influenzae Typ B-Konjugatimpfstoff	ACT-HiB® (nur über Import)	

Notfallantibiotikatherapie – Optionen

bei Kindern	
p.o.	Amoxicillin / Clavulansäure 3 x 25 mg/kg/KG
i.v.	Ceftriaxon 1 x 80 mg/kg/KG

bei Erwachsenen	
p.o.	Amoxicillin / Clavulansäure 3 x 1000 mg
i.v.	Ceftriaxon 1 x 2000 mg

bei Allergie	
Penicillinallergie	Cefpodoximproxetil
β-Laktamallergie	Clarithromycin

Empfehlungen zur Antibiotikaphylaxe
siehe www.asplenie-net.org

Erhöhtes Infektionsrisiko

Sepsis mit bekapselten Bakterien: Pneumokokken (häufig), Meningokokken, H. influenzae

Sepsis nach Tierbissen: Capnocytophaga canimorsus

Parasitosen: Babesia (Zeckenstiche), Malaria

Bei Fieber oder Infektionszeichen ist eine schnelle Antibiotikatherapie angezeigt !