
Hazard Ratio
Hazard Ratio
Study or Subgroup log[Hazard Ratio] SE Weight IV, Random, 95% CI
IV, Random, 95% CI
1.4.1 Up to six months
Roach 2008 -0.17 0.11 17.8% 0.84 [0.68, 1.05]
D'Amico 2008 -0.58 0.25 6.4% 0.56 [0.34, 0.91]
Denham 2011 (3 m) -0.17 0.13 15.2% 0.84 [0.65, 1.09]
Denham 2011 (6 m) -0.46 0.14 14.0% 0.63 [0.48, 0.83]
Jones 2011 -0.16 0.07 23.9% 0.85 [0.74, 0.98]
Subtotal (95% CI) 77.2% 0.79 [0.69, 0.90]
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 6.10, df = 4 (P = 0.19); I² = 34%
Test for overall effect: Z = 3.60 (P = 0.0003)
1.4.2 One year or more
Lawton 2005 -0.21 0.24 6.8% 0.81 [0.51, 1.30]
Granfors 2006 -0.48 0.27 5.6% 0.62 [0.36, 1.05]
Bolla 2010 -0.67 0.18 10.3% 0.51 [0.36, 0.73]
Subtotal (95% CI) 22.8% 0.61 [0.47, 0.81]
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 2.36, df = 2 (P = 0.31); I² = 15%
Test for overall effect: Z = 3.51 (P = 0.0005)
Total (95% CI) 100.0% 0.74 [0.64, 0.85]
Heterogeneity: Tau² = 0.02; Chi² = 12.74, df = 7 (P = 0.08); I² = 45%
Test for overall effect: Z = 4.33 (P < 0.0001)
Test for subgroup differences: Chi² = 4.29, df = 1 (P = 0.04), I² = 76.7%
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Favours HT+RT Favours RT