
Author, year
Prevalence (95% CI)
Weight (%)
Guimón et al, 1980
8.0 (3.4–12.3)
5.0
Farré and Narbona, 1989
1.0 (0.01–1.7)
6.8
Gutiérrez-Bengoechea, 1992
4.5 (3.2–5.7)
6.7
Benjumea and Mojarro, 1993
5.0 (4.1-6.0)
6.7
Verdeguer, 1994
7.1 (4.3-10.0)
6.0
Gómez-Beneyto et al, 1994 (8 years)
14.4 (10.6-18.2)
5.4
Gómez-Beneyto et al, 1994 (11 years)
5.3 (3.0-7.4)
6.3
Gómez-Beneyto et al, 1994 (15 years)
3.0 (1.3-4.5)
6.5
Andrés-Carrasco et al, 1995 and 1999
8.0 (5.3-10.7)
6.0
Eddy, 1997
5.7 (2.9-8.5)
6.0
Ruíz et al, 1999
14.0 (12.2-15.9)
6.5
García-Jiménez et al, 2005
9.0 (5.2-12.8)
5.5
Blázquez-Almeria et al, 2005
12.2 (10.8-13.4)
6.6
Rodríguez-Hernández et al, 2006
3.9 (2.3-5.4)
6.6
Rodríguez-Molinero et al, 2009
6.7 (5.2-8.1)
6.6
Cardo et al, 2007 and 2011
4.6 (3.5-5.6)
6.7
Prevalence (overall)
6.8 (4.9-8.8)
100.0
0
5.0
10.0
15.0