Study or Subgroup	SSRI Events	SSRI Total	Placebo Events	Placebo Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
Byerley et al. 1988	25	32	23	29	20.2%	0.99 [0.76, 1.28]
Corrigan et al. 2000	2	33	2	34	2.2%	1.03 [0.15, 6.89]
Doogan et al. 1994	7	99	3	101	4.1%	2.38 [0.63, 8.94]
Edwards et al. 1993	4	21	1	20	1.8%	3.81 [0.46, 31.23]
Fabre et al. 1995	17	278	3	91	4.8%	1.85 [0.56, 6.19]
Fava et al. 2005	10	47	5	43	6.5%	1.83 [0.68, 4.93]
LVM-MD-06	1	79	1	93	1.1%	1.18 [0.07, 18.52]
Muijen et al. 1988	13	26	6	28	8.6%	2.33 [1.04, 5.23]
NCT01473381	5	282	7	281	5.3%	0.71 [0.23, 2.22]
Nemeroff et al. 2007	5	104	2	102	2.9%	2.45 [0.49, 12.35]
Nierenberg et al (2007)	6	274	1	137	1.8%	3.00 [0.36, 24.67]
PAR 29060.07.001	1	13	1	12	1.2%	0.92 [0.06, 13.18]
Perahia et al (2006)	2	97	0	99	0.9%	5.10 [0.25, 104.92]
Ratti et al. 2011	3	120	7	120	4.1%	0.43 [0.11, 1.62]
Reimherr et al. 1990	5	149	2	150	2.9%	2.52 [0.50, 12.77]
Schatzberg 2006	2	100	2	96	2.1%	0.96 [0.14, 6.68]
Sheehan et al. 2009	6	99	4	96	4.6%	1.45 [0.42, 4.99]
Tollefson et al. 1995 (1)	56	335	25	336	15.5%	2.25 [1.44, 3.51]
Tollefson et al. 1995 (2)	0	0	0	0		Not estimable
Wakelin 1986	13	32	3	14	5.6%	1.90 [0.64, 5.62]
Wang et al 2014	6	156	3	155	3.9%	1.99 [0.51, 7.80]
Total (95% CI)		**2376**		**2037**	**100.0%**	**1.55 [1.16, 2.08]**
Total events	189		101			

Heterogeneity: Tau² = 0.09; Chi² = 26.40, df = 19 (P = 0.12); I² = 28%

Test for overall effect: Z = 2.92 (P = 0.003)



Footnotes

(1) nausea

(2) Dyspepsia