| Study or Subgroup | log[Hazard Ratio] | SE | Weight | Hazard Ratio IV, Fixed, 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| Calais da Silva 2009/2011 | 0.04082199 | 0.09302291 | 13.4% | 1.04 [0.87, 1.25] |
| Crook 2012 | 0.01980263 | 0.08705543 | 15.3% | 1.02 [0.86, 1.21] |
| Hussain 2013 | 0.09531018 | 0.06416923 | 28.2% | 1.10 [0.97, 1.25] |
| Irani 2008 | 0.51082562 | 0.26909671 | 1.6% | 1.67 [0.98, 2.82] |
| Miller 2007 | 0.03922071 | 0.0969628 | 12.4% | 1.04 [0.86, 1.26] |
| Mottet 2012 | 0.13102826 | 0.22048025 | 2.4% | 1.14 [0.74, 1.76] |
| Salonen 2012/2013 | -0.13976194 | 0.10287809 | 11.0% | 0.87 [0.71, 1.06] |
| Silva 2013 | -0.10536052 | 0.08626502 | 15.6% | 0.90 [0.76, 1.07] |
| **Total (95% CI)** | | | **100.0%** | **1.02 [0.95, 1.09]** |

Heterogeneity: $Chi^2 = 9.57$, df = 7 (P = 0.21); $I^2 = 27\%$

Test for overall effect: Z = 0.58 (P = 0.56)