

Enquête du CRI

Traitements par agents anti-TNF : quel bilan pré-thérapeutique ?

Frédéric Lioté, Thao Pham, Philippe Ravaud

Les traitements anti-TNF sont prescrits chez des patients atteints de PR ou de spondylarthropathies. Les indications sont actuellement libellées selon les AMM. Ils exposent à un certain nombre d'effets secondaires de sévérité variable pour lesquels il n'y a actuellement en France que peu de recommandations de pratiques ou de prescription d'examens pré-thérapeutiques. Chaque clinicien évalue le cas particulier de son patient selon sa propre expérience.

Au nom du CRI, nous vous proposons de répondre à une enquête anonyme à partir d'un cas clinique, simple et rapide, sur vos pratiques cliniques et les mesures que vous prenez chez vos patients avant prescription d'un traitement anti-TNF. Il s'agit de faire un instantané, un état des lieux des pratiques réelles dans notre pays.

Age : |_|_| ans

Sexe F M

Année d'obtention de la spécialité : |_|_|_|_|

Membre de la SFR: Oui Non

Modalités actuelles d'exercice :

- libéral exclusif
- praticien attaché hospitalier et exercice libéral
- hospitalier temps plein temps partiel
- hospitalo-universitaire (PU-PH, PHU, MCU-PH) CCA interne de spécialité

Avez-vous déjà prescrit vous-même un traitement anti-TNF ?

Oui Non

Dans le service hospitalier où vous exercez en consultation ou en salle, disposez-vous d'une liste systématique d'items et d'examens à vérifier avant prescription d'un anti-TNF ?

Oui Non Ne sait pas

Numéro d'anonymat : C

Femme, 50 ans, polyarthrite rhumatoïde séropositive (FR IgM) depuis 7 ans avec :

- Echappement à une bithérapie MTX (20 mg/sem PO) + Salazopyrine (2 g/j) + corticothérapie de 10 mg/j + AINS conventionnel à pleine dose.
- Antécédents :
 - o ménopause depuis 1 an non substituée, fibro-adénome mammaire
 - o hypothyroïdie secondaire à une maladie de Hashimoto
 - o Fille de 29 ans atteinte de la même dysthyroïdie
 - o Fracture de côte après chute au décours d'un vertige de Ménière
- Examen clinique
 - o Pression artérielle = 120/76, auscultation cardiopulmonaire normale
 - o Absence de nodule rhumatoïde ou de signe de vascularite

Vous voulez traiter cette patiente par un agent anti-TNF. Quel est votre bilan pré-thérapeutique (en dehors du bilan d'activité ou de sévérité de la maladie) ?

1. Quels antécédents recherchez-vous spécifiquement ?

a. primo-infection ou de tuberculose viscérale	<input type="checkbox"/>
b. antécédent neurologique familial	<input type="checkbox"/>
c. infections ORL	<input type="checkbox"/>
d. infections cutanées	<input type="checkbox"/>
e. néoplasie ou d'hémopathie	<input type="checkbox"/>
f. antécédent neurologique	<input type="checkbox"/>
g. thrombose veineuse et/ou d'embolie pulmonaire	<input type="checkbox"/>
h. antécédent cardiovasculaire familial	<input type="checkbox"/>
i. cirrhose	<input type="checkbox"/>
j. arthrite septique	<input type="checkbox"/>
k. septicémie	<input type="checkbox"/>
l. antécédent diabétique familial	<input type="checkbox"/>
m. infections broncho-pulmonaires	<input type="checkbox"/>
n. infections urinaires	<input type="checkbox"/>
o. notion d'une positivité d'une IDR à la tuberculine	<input type="checkbox"/>
p. qualité d'un éventuel traitement anti-tuberculeux	<input type="checkbox"/>
q. consommation alcool-tabagique	<input type="checkbox"/>
r. notion d'une vaccination par le BCG	<input type="checkbox"/>
s. existence de prothèses articulaires	<input type="checkbox"/>
t. gammopathie monoclonale	<input type="checkbox"/>

2. Quel examen clinique pratiqueriez-vous personnellement ?

a. examen ORL	<input type="checkbox"/>
b. auscultation cardiaque	<input type="checkbox"/>
c. auscultation pulmonaire	<input type="checkbox"/>
d. examen des aires ganglionnaires	<input type="checkbox"/>
e. examen neurologique	<input type="checkbox"/>
f. état buccodentaire	<input type="checkbox"/>
g. examen des téguments	<input type="checkbox"/>

3. Quels examens prescririez-vous ?

a. électrophorèse des protides sériques	<input type="checkbox"/>
b. radiographie pulmonaire	<input type="checkbox"/>
c. détection des anticorps antinucléaires	<input type="checkbox"/>
d. dosage des transaminases	<input type="checkbox"/>
e. sérologie du VIH	<input type="checkbox"/>
f. sérologie d'hépatite C	<input type="checkbox"/>
g. hémogramme	<input type="checkbox"/>

4. Quelles autres mesures prendriez-vous ?

a. IDR 10 Unités	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------