


मुझे मासिक धर्म के समय बहुत दर्द होता है :

पूछें	देखें/महसूस/करें सुनें	लक्षण	वर्गीकरण	प्रबन्धन
<p>दर्द</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपको पहले भी ऐसा दर्द हुआ है क्या यह दर्द सामान्यतः आपको मासिक धर्म के समय हुआ, या मासिक धर्म के वीच में क्या आपको अभी रक्तस्राव हो रहा है / क्या आपको अभी मासिक धर्म हो रहा है क्या अभी आपको दर्द हो रहा है मासिक धर्म जैसा है / या यह बहुत कम / बहुत ज्यादा है <p>अगर शादी हुई हैं तो (यौन रूप से सक्रिय हैं)</p> 	<p>पेट की जाँच</p> <ul style="list-style-type: none"> निचले पेट में दर्द हैं क्या दर्द हल्का/थोड़ा ज्यादा/ बहुत ज्यादा है <p>गर्भावस्था (यौन रूप से सक्रिय हैं) अगर यौन रूप से सक्रिय है तो :</p> <ul style="list-style-type: none"> गर्भनिरोध का प्रयोग सही ढंग से और लगातार नहीं करते या उसे मासिक धर्म देर से होता है या उसे गर्भावस्था के कोई लक्षण हैं <p>गर्भावस्था के लक्षण देखें</p> <ul style="list-style-type: none"> गर्भावस्था जाँच करें 	<p>अभी दर्द हैं</p> <p>और</p> <p>गर्भावस्था हो सकती हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> अगर यौन रूप से सक्रिय है तो अगर गर्भनिरोधक प्रयोग नहीं करती है तो मासिक देर से आया है और गर्भावस्था का कोई लक्षण हैं <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> अभी रक्तस्राव हो रहा है और रक्तस्राव सामान्य मासिक धर्म जैसा नहीं हैं दवाने से पेट में दर्द होता हैं 	<p>Possible threatened abortion/ectopic pregnancy संभाविक गर्भपात / अस्थानिक गर्भावस्था</p> 	<p>Urgent referral to Medical Officer/Gynaecologist(स्त्री रोग विशेषज्ञ)</p>
<ul style="list-style-type: none"> क्या आप गर्भ की रोकथाम के लिए कोई गर्भ निरोधक प्रयोग करती हैं आप कौन सा तरीका अपनाती हैं अगर मौखिक गर्भनिरोधक गोली का प्रयोग करती है तो : क्या आप कभी अपनी गोली लेना भुली हैं अगर कन्डोम प्रयोग करती है तो : क्या आप कन्डोम हर समय प्रयोग करती है जब भी सम्भोग करती हैं 	<p>पेट की जाँच करें</p> <ul style="list-style-type: none"> निचले पेट में दर्द हैं क्या दर्द हल्का/थोड़ा ज्यादा/ बहुत ज्यादा है <p>और</p> <p>अगर शादी हुई हैं तो (यौन रूप से सक्रिय हैं)</p> <p>गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं हैं</p>	<ul style="list-style-type: none"> अगर मासिक धर्म के पहले और वीच में दर्द होता हैं अगर अभी दर्द हैं दवाने से पेट में दर्द नहीं होता हैं अगर अभी रक्तस्राव हो रहा है रक्तस्राव सामान्य मासिक धर्म जैसा हैं <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> गर्भावस्था नहीं हो सकती हैं 	<p>Dysmenorrhoea</p> 	<p>Treat pain: Hot fomentation when she gets pain</p> <p>If this does not control pain, then it requires medications so refer to Medical Officer for initiation of treatment.</p> <p>Advise to take tablets as soon as pain begins Do not give for more than 7 days</p> <p>Advice her to continue with her daily activities</p> <p>Follow up: Follow up after 3 months</p> <p>If there is no improvement after 3 months then refer to Medical Officer</p>

मुझे मासिकधर्म के दौरान बहुत रक्तस्राव होता है :

पूछें	देखें/महसूस/करें सुनें	लक्षण	वर्गीकरण	प्रभन्दन
मासिक धर्म के समय <ul style="list-style-type: none"> क्या आपको अभी मासिकधर्म/रक्तस्राव हो रहा है आपको मासिकधर्म कितने दिनों में बंद हो जाता है मासिकधर्म के समय कितने सेनिटरी नैपकिन/पड़/रुई के पैड/अन्य उपकरण प्रयोग हो जाते हैं 	गर्भावस्था अगर यौन रूप से सक्रिय है तो : <ul style="list-style-type: none"> गर्भनिरोधक का प्रयोग सही ढंग से और लगातार नहीं करते या उसको मासिकधर्म देर से होता है या उसको गर्भावस्था के कोई लक्षण हैं देखें नीचली पेट में बच्चेदानी को करे गर्भावस्था (पेशाव) की टेस्ट	अगर अभी मासिकधर्म/रक्तस्राव हो रहा है और गर्भावस्था और गर्भावस्था होने की संभावना हैं <ul style="list-style-type: none"> यौन रूप से सक्रिय है गर्भनिरोध का प्रयोग सही ढंग से और लगातार नहीं करते या उसको मासिकधर्म देर से होता है गर्भावस्था का कोई लक्षण हैं 	Possible threatened abortion/ectopic pregnancy संभाविक गर्भपात / अस्थानिक गर्भावस्था	Urgent referral to Medical Officer/Gynaecologist(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
अगर शारीर हुई हैं तो (यौन रूप से सक्रिय हैं) <ul style="list-style-type: none"> क्या आप गर्भ की रोकथाम के लिए कोई गर्भनिरोधक प्रयोग करती हैं अगर हॉ तो आप कौन सा तरीका प्रयोग करती हैं अगर कापर टी का प्रयोग नहीं करती है : 				
गर्भावस्था <ul style="list-style-type: none"> अगर कंडोम प्रयोग करती हैं तो : क्या आप हर समय जब भी संभोग करती है कंडोम का प्रयोग करती हैं अगर मौखिक गर्भनिरोधक गोली का प्रयोग करती हैं तो : क्या आप कभी अपनी गोली लेना भूली हैं 	मासिकधर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है और गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं हैं खून की कमी (अनीमिया) का कोई लक्षण हैं जोच के लिए <ul style="list-style-type: none"> हथेली का फीकापन ऑख्र की निचली डिल्ली का फीकापन हीमोग्लोबिन टेस्ट करें	<ul style="list-style-type: none"> अगर 7 से ज्यादा पैड को बदलना पड़ता है 7 दिन से ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है अनीमिया कि कोई लक्षण <ul style="list-style-type: none"> हथेली का फीकापन ऑख्र की निचली डिल्ली का फीकापन हीमोग्लोबिन 12 से कम है 	Menorrhagia with anemia	For regulating bleeding Needs treatment so refer to Medical Officer for initiation of treatment Treat anaemia Iron –Folic acid tablets 200mg Start 1 tablet orally 3 times per day Treat for 3 months Follow up for drug supply after 3 months
खून की कमी (अनीमिया) <ul style="list-style-type: none"> क्या आपका एक मासिकधर्म छूट गया या आपको मासिक धर्म देर से हुआ क्या आपको निम्न में से कोई लक्षण हैं : <ul style="list-style-type: none"> सुवह मिचली / उल्टी स्तन में भारीपन या दर्द 	मासिकधर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है और खून की कमी (अनीमिया) का कोई लक्षण नहीं हैं	<ul style="list-style-type: none"> अगर 7 से ज्यादा पैड को बदलना पड़ता है 7 दिन से ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है अनीमिया कि कोई लक्षण नहीं हैं हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर हैं कांपर टीं का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं 	Menorrhagia with no anemia	Regulate bleeding (as above) AND Prevent anaemia Iron –Folic acid tablets 200mg 1 tablet orally 1 time per day Treat for 3 months Review after 3 cycles
	मासिकधर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है और गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं हैं और अगर कापर टी का प्रयोग करती हैं तो	<ul style="list-style-type: none"> अगर 7 से ज्यादा बार पैड को बदलना पड़ता है 7 दिन से ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है और कांपर टीं का इस्तेमाल कर रही हैं 	Menorrhagia possibly associated with contraception method (Copper T)	Regulate bleeding (as above) Treat/ Prevent anaemia (as above) After 3 months if heavy bleeding continues discuss the removal of Copper T and starting alternative methods

मुझे अनियमित मासिकधर्म होता है मेरा मासिकधर्म बंद हो गया है

पूछें	देखें/महसूस/करें सुनें	लक्षण	वर्गीकरण	प्रभन्दन
अनियमित मासिकधर्म	अगर यौन रूप से सक्रिय है तो : <ul style="list-style-type: none"> गर्भनिरोध का प्रयोग सही ढंग से और लगातार नहीं करते हैं या उसको मासिकधर्म देर से होता है या उसको गर्भावस्था के कोई लक्षण हैं देखें नीचली पेट में बच्चेदानी को करे गर्भावस्था (पेशाव) की टेस्ट	अगर अभी मासिकधर्म/रक्तस्राव हो रहा है और गर्भावस्था और गर्भावस्था होने की संभावना हैं <ul style="list-style-type: none"> यौन रूप से सक्रिय है गर्भनिरोध का प्रयोग सही ढंग से और लगातार नहीं करते हैं या उसको मासिकधर्म देर से होता है गर्भावस्था का कोई लक्षण हैं 	Possible threatened abortion OR Possible ectopic pregnancy संभाविक गर्भपात / अस्थानिक गर्भावस्था	Urgent referral to Medical Officer/Gynaecologist(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
अगर शारीर हुई हैं तो (यौन रूप से सक्रिय हैं)	अगर पहला मासिकधर्म 2 साल पहले हुआ था अनियमित मासिकधर्म	Irregular periods Not associated with hormonal contraceptives	Refer to Medical Officer/ Gynaecologist(स्त्री रोग विशेषज्ञ)	
गर्भावस्था	अनियमित मासिकधर्म (ऊपर बताया गया) और पिछले 6 महीने में या अभी हारमोनल गर्भनिरोध का इस्तेमाल कर रही हैं	Irregular periods Associated with hormonal contraceptives	If using OCPs* and not taking it regularly Advice her to use alternative methods like condom until she has been taking OCPs regularly for atleast 7 days	
	माला एन		If taking OCPs regularly If this is less than 4 months advice her that irregular bleeding is common during this period	
			If taking OCPs for more than 4 months then refer	
	अगर पहला मासिकधर्म 2 साल में हुआ था अनियमित मासिकधर्म जैसे (ऊपर बताया गया)	Menstrual irregularity of early adolescents	Reassure that irregular bleeding is common in first 2 years and periods are likely to become regular with time.	

*OCP- Oral contraceptive pills like Mala N, Mala D

यौवन अवस्था में देरी

पूछें	देखें/महसूस/करें सुनें	लक्षण	वर्गीकरण	प्रभन्दन
<ul style="list-style-type: none"> आप कितने वर्ष की हैं? <p>स्तन (वक्ष) विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपने अपने स्तन के आकार में कोई परिवर्तन देखा है? <p>अगर स्तन विकास शुरू हुआ तो</p> <ul style="list-style-type: none"> आप कितने वर्ष की थीं जब आपने यह परिवर्तन देखा था? <p>Pubic hair* (जघन बाल)</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपके शरीर में जननांगों के पास वाल उगे? <p>अगर जघन बाल है तो :</p> <ul style="list-style-type: none"> आप कितने साल की थीं जब आपने यह खड़ा किया? <p>मासिक धर्म (महिना)</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपको मासिक धर्म (महिना) शुरू हो गया है? <p>अगर मासिक धर्म (महिना) शुरू हो गया है तो :</p> <ul style="list-style-type: none"> आप कितने साल की थीं जब आपको पहला मासिक धर्म शुरू हुआ <p>दीर्घस्थायी बीमारी</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपको कोई पुरानी (लंबे समय से) बीमारी है <p>(नोट: अगर लंबे समय से चल रही बीमारी के कोई लक्षण जैसे : बुखार, खांसी, दस्त, वजन कम होना इत्यादि)</p>	<p>जॉच करना</p> <ul style="list-style-type: none"> वजन लंबाई <p>गणना करना</p> <ul style="list-style-type: none"> $BMI^{\#} = \text{वजन} / \text{लंबाई}^2$ <p>जॉच</p> <ul style="list-style-type: none"> स्तन = स्तन tissue की उपस्थिति एवम् चूचुक (nipple) के आस पास का रंग और आकार Presence of pubic hair <p>जांच करें</p> <ul style="list-style-type: none"> आगर लम्बे समय से बुखार, खांसी, दस्त, वजन का घटना इत्यादि हैं <ul style="list-style-type: none"> हथेली का फीकापन ऑँग्र की निचली झिल्ली का फीकापन बुखार 	<ul style="list-style-type: none"> 14 वर्ष की उम्र तक स्तन का विकास न होना। 14 वर्ष की उम्र तक <i>Pubic hair</i> 16 वर्ष की उम्र तक महिना न होना। 5 साल से ज्यादा समय बीत गया जब स्तन विकास का पहला लक्षण दिखा परन्तु अभी तक पहला महिना नहीं आया। <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> पोषण की कमी दीर्घस्थायी बीमारी के लक्षण <ul style="list-style-type: none"> 14 वर्ष की उम्र तक स्तन का विकास न होना। 14 वर्ष की उम्र तक <i>Pubic hair</i> 16 वर्ष की उम्र तक महिना न होना। 5 साल से ज्यादा समय बीत गया जब स्तन विकास का पहला लक्षण दिखा परन्तु अभी तक पहला महिना नहीं आया। <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> पोषण की कमी और पुरानी बीमारी के लक्षण नहीं हैं <ul style="list-style-type: none"> 13 साल की है या छोटी है अगर 14 साल या उस से बड़ी है तो स्तन विकास शुरू हो गया। अगर 14 साल या उस से बड़ी है तो <i>Pubic hair</i> है। अगर 16 साल या उस से बड़ी है तो महिना शुरू हो गया। <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 साल से कम समय बीत गया जब स्तन विकास का पहला लक्षण दिखा और उससे पहला महिना आया। 	<p>यौवन अवस्था में देरी</p> <p>Possibly due to chronic illness OR Undernutrition</p> <p>यौवन अवस्था में देरी</p> <p>Unlikely to be due to chronic illness OR Undernutrition</p> <p>Normal</p>	<ul style="list-style-type: none"> Refer to Medical officer Address nutritional problems Review after 6 months for assessment of pubertal development <ul style="list-style-type: none"> Advice her that pubertal development is delayed for her age Refer to Medical Officer Reassure that even though puberty is delayed, most girls will eventually go through puberty. Stress that a small number do not and that is why she needs to be checked further <ul style="list-style-type: none"> Reassure that even if the signs of pubertal development have not appeared, she is within normal limits for age Reassure that most girls will eventually develop and go through puberty

* Pubic hair: वाहरीय जननांग के पास वाल होना

#BMI: Body mass index. प्रशिक्षण पुस्तिका के अनुबन्ध को देखिये

मुझे मेरी जननेन्द्रिय (गुप्तांग/योनि) से असाधारण ज्वलनशील अथवा खुजली वाला स्राव होता हैं

पूछें	देखें/महसूस/करें सुनें	लक्षण	वर्गीकरण	प्रभन्दन
<p>योनि से स्राव क्या आप अपने स्राव की प्रकार के बारें में बताएंगी ?</p> <ul style="list-style-type: none"> रंग : क्या स्राव/साफ सफेद/हरा/ भूरा/पीला था स्थिरता : क्या स्राव पतला या गाढ़ा था दुर्गंध : क्या स्राव में दुर्गंध थी खुजली या जलन : क्या आपको जननेन्द्रियों (गुप्तांग/योनि) में खुजली या जलन होती है। निचले पेट में दर्द : क्या आपको निचले पेट में दर्द होता है <ul style="list-style-type: none"> अगर पेट में दर्द हैं तो देखें हाल ही में प्रसव असामान्य योनि स्राव <p>अगर शादी हुई हैं तो (यौन रूप से सक्रिय हैं) क्या आपको कोई और जननेन्द्रिय संबंधी समस्या है</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या आपको पेट और जाँघ के बीच के भाग में सुजन है पति को कोई जननेन्द्रिय संबंधी समस्या है मूत्रात्याग में दर्द होना (पुरुष) 	<p>पेट की जांच</p> <ul style="list-style-type: none"> निचले पेट में दर्द हैं क्या दर्द हल्का/थोड़ा ज्यादा/ बहुत ज्यादा है <p>सामान्य शरीरिक जांच (पहले उल्लेख किया गया)</p>	<p>असामान्य योनि स्राव है :</p> <ul style="list-style-type: none"> रंग : अगर स्राव सफेद/हरा/ भूरा/पीला है स्थिरता : अगर स्राव गाढ़ा है दुर्गंध : अगर स्राव में दुर्गंध है खुजली या जलन : अगर जननेन्द्रियों (गुप्तांग/योनि) में खुजली या जलन है <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> निचले पेट में दर्द नहीं हैं 	Reproductive tract infections (RTIs)	Refer to Medical Officer Advice about completion of course of medications Stress the importance of genital and menstrual hygiene
		<p>असामान्य योनि स्राव है :</p> <ul style="list-style-type: none"> रंग : अगर स्राव सफेद/हरा/ भूरा/पीला है स्थिरता : अगर स्राव गाढ़ा है दुर्गंध : अगर स्राव में दुर्गंध है खुजली या जलन : अगर जननेन्द्रियों (गुप्तांग/योनि) में खुजली या जलन है <p>और</p> <ul style="list-style-type: none"> निचले पेट में दर्द नहीं हैं <p>और</p> <p>गोनोरेंसिया (Gonorrhoea) या क्लामैडिया (Chlamydia) या कोई STI* होने कि आशंका है</p>	Pelvic inflammatory disease(PID) OR Sexually transmitted disease(STI)	Refer to Medical Officer Advice about completion of course of medications Stress the importance of genital and menstrual hygiene In married couples encourage consistent use of condoms(Nirodh) Follow up after 1 week
		<p>सामान्य योनि स्राव है :</p> <ul style="list-style-type: none"> स्पष्ट है पतला है कोई वदवूं नहीं है माहवारी चक्र के बीच में स्राव को थोड़ा गाढ़ा या चिपचिपा होती है 	Normal	Reassure that this is normal vaginal discharge Advice the girl about maintaining genital hygiene

*STI- Sexually transmitted infections (यौन संक्रमण).

PID- Infection of Uterus, Fallopian tube, Ovaries etc. Most common cause is STI.