Study or Subgroup	log[Risk Ratio]	SE	Weight	Risk Ratio IV, Fixed, 95% CI
4.1.1 Pre- HAART				
Burns 1996	0.45	0.16	32.4%	1.57 [1.15, 2.15]
Conley 1996	0.96	0.35	6.8%	2.61 [1.32, 5.19]
Hirschtick 1995	0.26	0.18	25.6%	1.30 [0.91, 1.85]
Kohli 2006	0.75	0.27	11.4%	2.12 [1.25, 3.59]
Subtotal (95% CI)			**76.0%**	**1.61 [1.31, 1.98]**
Heterogeneity: Chi² = 4.41, df = 3 (P = 0.22); I² = 32%				
Test for overall effect: Z = 4.56 (P < 0.00001)				
4.1.2 Post- HAART				
Crothers 2005	1.04	0.33	7.6%	2.83 [1.48, 5.40]
Gordin 2008	0.6	0.26	12.3%	1.82 [1.09, 3.03]
Le Moing 2006	1.24	0.6	2.3%	3.46 [1.07, 11.20]
Lopez- Palomo 2004	0.13	0.68	1.8%	1.14 [0.30, 4.32]
Subtotal (95% CI)			**24.0%**	**2.15 [1.49, 3.10]**
Heterogeneity: Chi² = 2.60, df = 3 (P = 0.46); I² = 0%				
Test for overall effect: Z = 4.12 (P < 0.0001)				
Total (95% CI)			**100.0%**	**1.73 [1.44, 2.06]**
Heterogeneity: Chi² = 8.85, df = 7 (P = 0.26); I² = 21%				
Test for overall effect: Z = 6.00 (P < 0.00001)				
Test for subgroup differences: Chi² = 1.85, df = 1 (P = 0.17), I² = 45.8%