
a)
p<0.0001
p=0.002
p=0.002
CXCL8 in serum (log 10 pg/mL)
10000
1000
100
10
1
0.1
1
2
3
4
5
Patient groups
b)
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
CXCL8 in CSF (log 10 pg/mL)
10000
1000
100
10
1
1
2
3
4
5
Patient groups
c)
IL-17 in serum (log 10 pg/mL)
10000
1000
100
10
1
0.1
1
2
3
4
5
Patient groups
d)
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
IL-17 in CSF (log 10 pg/mL)
100
10
1
0.1
1
2
3
4
5
Patient groups
e)
p=0.001
p=0.001
p=0.002
p=0.009
CXCL10 in serum (log 10 pg/mL)
10000
1000
100
10
1
2
3
4
5
Patient groups
f)
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
CXCL10 in CSF (log 10 pg/mL)
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
1
2
3
4
5
Patient groups
g)
CCL22 in serum (log 10 pg/mL)
10000
1000
100
10
1
2
3
4
5
Patient groups
h)
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
p<0.0001
CCL22 in CSF (log 10 pg/mL)
5000
500
50
5
1
2
3
4
5
Patient groups