
A)
Bone Mineral Content (x 10 -3 kg), whole body
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
*N+nsB
nsN+*B
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease


D)
Bone Mineral Density (g/cm 2), whole body
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
*N+nsB
nsN+*B
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease


B)
Bone Mineral Content (x 10 -3 kg), Lumbar spine
100
80
60
40
20
0
nsN+nsB
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease


E)
Bone Mineral Density (g/cm 2), Lumbar spine
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
nsN
nsN+**B
nsN+**B
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease


C)
Bone Mineral Content (x 10 -3 kg), femural neck
8
7
6
5
4
3
2
1
0
nsN+nsB
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease


F)
Bone Mineral Density (g/cm 2), femural neck
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
nsN
nsN+*B
nsN+*B
nsN
0
3
18
36
Normal controls
Month Graves' disease
Hashimoto's disease