Urinary tract infections

Study	Treatment Events	Treatment Total	Control Events	Control Total	Odds Ratio M-H, Random, 95% CI
High risk of bias					
Shoemaker [38]	1	28	1	60	2.19 [0.13, 36.26]
Subtotal (95% CI)		**28**		**60**	**2.19 [0.13, 36.26]**
Total events	**1**		**1**		
Heterogeneity: Not applicable					
Test for overall effect: Z = 0.55 (P = 0.59)					
Low risk of bias					
Benes [22]	3	60	13	60	0.19 [0.05, 0.71]
Chytra [25]	3	80	2	82	1.56 [0.25, 9.58]
Lobo [30]	0	19	1	18	0.30 [0.01, 7.83]
Lopes [31]	0	17	1	16	0.30 [0.01, 7.79]
Mayer [32]	0	30	0	30	Not estimable
Pearse [36]	1	62	3	60	0.31 [0.03, 3.08]
Van der Linden [42]	2	40	1	17	0.84 [0.07, 9.96]
Venn [44]	2	30	4	60	1.00 [0.17, 5.79]
Wilson [46]	1	92	5	46	0.09 [0.01, 0.80]
Subtotal (95% CI)		**430**		**389**	**0.40 [0.19, 0.81]**
Total events	**12**		**30**		
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 6.72, df = 7 (P = 0.46); I² = 0%					
Test for overall effect: Z = 2.54 (P = 0.01)					
Total (95% CI)		**458**		**449**	**0.44 [0.22, 0.88]**
Total events	**13**		**31**		
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 8.07, df = 8 (P = 0.43); I² = 1%					
Test for overall effect: Z = 2.30 (P = 0.02)