

Table 6: Intraorale, extraorale und dysfunktionale Zeichen bei 606 CMD-CCD-Patienten mit schlechtem Schlaf

CMD-CCD-Zeichen	Anzahl der Patienten absolut	Anzahl der Patienten in %
Engstände in der Unterkieferfront	527	86,8
Retrallage UK	540	89,0
Mittellinienabweichung	411	67,7
Schmelzfacetten	595	98,0
Gingivarezessionen	590	97,2
Tiefe/ungünstige Spee-Kurve	395	65,1
Gesichtsskoliose	412	67,9
Pathologische Seitenabweichung beim Öffnen und/oder Schließen mit > 2 mm	540	89,0
Mundöffnung eingeschränkt (< 40 mm)	63	10,4
Protrusion eingeschränkt (< 9 mm)	229	37,7
Seitbewegung links und/oder rechts eingeschränkt (< 9 mm)	159	26,2
Kiefergelenkknacken (vom Patienten angegeben)	452	74,5
Kopfvorhaltung	599	98,7
Schulterschiefstand	603	99,3
Beinlängendifferenz im Ausgangszustand	599	97,9
Hüftblockade	606	100
Hüftabduktionstest nach Patrick Kubis bei 942 CMD-CCD-Patienten im Schnitt im Ausgangszustand (rechte und linke Seite gemittelt)	38,7 Grad	